

# Plaagdieren van A tot Z

## Plaagdieren die voedsel en textiel aantasten



**KAKKERLAK.** Omnivoor, die binnendringt via goederen. Wordt 10-35 mm groot.



**RIJSTMEELEKEVER.** Tasten vooral graanproducten en meel aan. 4-6 mm, larven worden tot 10 mm groot.



**DIEFKEVER.** Omnivoor. Komen vooral voor in dubbele vloeren en soortgelijke omgevingen. Wordt 3-4 mm groot.



**MOT.** Leeft van o.a. graan, gedroogd fruit en noten. Vleugelwijdte is 14-25 mm. Larven worden 10-15 mm.



**TAPIJKEVER.** De larven beschadigen o.a. wol en bont. Volwassen kevers worden 4-5 mm groot, de larven 10 mm.



**KLEERMOT.** De larven beschadigen wol en bont. Volwassen motten hebben een vleugelwijdte van 12-14 mm.



**RAT.** Omnivoor die infecties verspreidt. Kan 25 cm groot worden (zonder staart).



**MUIS.** Omnivoor die materiaal kan besmetten en beschadigen. Wordt ca. 10 cm groot (zonder staart).



**GRAANKEVER.** Tasten vooral graanproducten en meel aan. Wordt tot 2-3 mm groot.



**BROOD- EN TABAKSKEVER.** Prefereert vaste voedselwaren en kruiden. Volwassen kevers worden 2-4 mm groot.



**GRAAN- /MEELMIJT.** Planten zich snel voort in vochtige omgevingen. Wordt 0,5 mm groot.



**ZWARTE MIER.** Dringt huizen binnenvoort op zoek naar voedsel. Wordt 2-4 mm groot.



**STOFLUIS.** Gedijt in vochtige omgevingen. Wordt 1-2 mm groot.



**ZILVERVISJE.** Prefereert vochtige, donkere plekken. Wordt 10 mm groot.



**GEWONE SPEKKEVER.** Leeft voornamelijk van vlees, kaas en gedroogde vis. Wordt 6-12 mm groot.

## Plaagdieren die de mens tot last zijn



**LUIS.** Hoofd-, klee- en schaamluis vallen de mens lastig. Wordt 1-3,5 mm groot.



**VLO.** Dierenvlooiën komen het meest voor, maar alle vlooiën vallen ook mensen lastig. Wordt 2-4 mm groot.



**BEDWANTS.** Zuigt bloed, vooral 's nachts. Wordt 5-6 mm groot.



**VOGELMIJT.** Kunnen in gebouwen voorkomen. De beten zijn erg onplezierig. Wordt 0,5-1 mm groot.



**WESPENNEST.** Voor het verwijderen van wespennesten kunt u het beste een gespecialiseerd bedrijf inschakelen.



## Aantasters van hout en bomen



**HUISBOKTOR.** Brengt ernstige schade toe aan bewerkte en onbewerkte hout. Wordt 7-20 mm groot.



**SPINTHOUTKEVER.** Tast onbewerkt hout aan van verschillende soorten bomen. Wordt 2-5 mm groot.



**DENNENBOKTOR.** De larven tasten onbewerkt hout aan. Wordt 4-6 mm groot.



**HOUTWORMKEVER.** Hun larven tasten zowel houten constructies als houten meubels aan. Wordt 2-4 mm groot.



**BLAUWE DENNENBOKTOR.** De larven tasten onbewerkt hout aan. Wordt 9-15 mm groot.



**REUZENMIER.** Koloniseert voornamelijk in hout in gebouwen. Wordt 6-18 mm groot.

## Overige plaagdieren



**SCHIMMELKEVER.** Wordt 1-3 mm groot.



**SPINMIJT.** Wordt 1 mm groot.



**PISSEBED.** Kan 18 mm groot worden.



**OORWORM.** Wordt 10-14 mm groot.



**SCHIMMELKEVER CRYPTOPHAGIDAE.** Wordt 1-3 mm groot.



**DUIZENDPOOT.** Kan 50 mm groot worden.



**HUISKREKEL.** Wordt 14-20 mm groot.